

NOG-IL6マウス血液性状

NOG-IL6 ♂		WBC	RBC	HGB	HCT	MCV	MCH	MCHC	PLT
		10 ² /μL	10 ⁴ /μL	g/dL	%	fL	pg	g/dL	10 ⁴ /μL
7w	Mean	15.2	847.0	13.8	41.2	48.6	16.3	33.5	78.1
	S.D	2.4	19.0	0.2	0.7	0.6	0.2	0.3	5.5
26w	Mean	29.8	831.2	12.3	39.6	47.7	14.9	31.2	95.1
	S.D	10.3	37.5	0.3	1.2	1.3	0.5	0.4	7.7

NOG-IL6 ♀		WBC	RBC	HGB	HCT	MCV	MCH	MCHC	PLT
		10 ² /μL	10 ⁴ /μL	g/dL	%	fL	pg	g/dL	10 ⁴ /μL
7w	Mean	12.2	798.0	13.0	38.7	48.5	16.3	33.5	60.5
	S.D	2.3	15.6	0.3	0.8	0.5	0.3	0.3	7.0
26w	Mean	15.8	827.1	12.2	39.1	47.3	14.8	31.2	83.1
	S.D	3.4	31.8	0.6	1.4	0.4	0.2	0.4	8.1

系統名	NOG-hIL-6 Tg (NOG-IL6マウス)	麻酔	イソフルラン吸入麻酔
飼料	放射線滅菌したCA-1を自由摂餌	採血部位	腹大動脈
生育場	日本クレア（株） 富士山生育場	検体	血清
絶食	16時間	測定機器	BiLSI 24i Premium, 東京貿易メディシス（株）
収容匹数	5匹/ケージ	測定日	7週齢：2020/5/29, 26週齢：2020/8/26